

Дітям роблять щеплення вакциною АКДП у 2, 4 та 6 місяців. У 18 місяців проводиться ревакцинація, згодом ревакцинацію проводять у 6 років вакциною АДП, наступну у 16 років — АДП-М.

Дорослі ж повинні ревакцинуватися (вакцинуватися повторно) кожні 10 років. Тобто якщо востаннє ви робили щеплення у 16, то першу ревакцинацію слід зробити в 26 років, другу - у 36 і так далі.

Якщо доросла людина або дитина старша 7 років раніше не вакцинувалися від дифтерії і правця, необхідно отримати як мінімум три дози вакцини АДП-М – спочатку перша доза, через місяць – друга, через 6 місяців після другої – третя.


ПАМ'ЯТАЙТЕ! Лише вакцинація рятує від дифтерії. 99% людей, що мають щеплення від дифтерії не хворіють.

Зробити щеплення від дифтерії можна безкоштовно для дорослих і дітей. Для того, щоб отримати вакцину, зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

ЗАХИСТИ СЕБЕ ВІД ДИФТЕРІЇ



ДИФТЕРІЯ - небезпечна інфекційна хвороба, яку викликає особливий мікроорганізм - дифтерійна паличка (коринебактерія).



Найчастіше збудник дифтерії проникає в організм повітряно-крапельним шляхом. При розмові, чханні, кашлі хворий виділяє навколо себе безліч мікробів, якими дихають інші люди. Ці мікроби осідають також на білизні, посуді, книжках, іграшках, інших предметах, через які також можна заразитися. Але можна заразитися і від носія бактерій, який зовні цілком здоровий і почувається добре. Такі люди дуже небезпечні.

Інкубаційний (прихований) період захворювання - від 3 до 10 днів. Джерело інфекції - хвора людина або носій коринебактерії, яка виділяє токсигенні штами збудника.

Захворювання проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання.



ОСНОВНІ СИМПТОМИ ДИФТЕРІЇ:

- ♦ біль у горлі,
- ♦ підвищена температура, лихоманка,
- ♦ набряк слизової оболонки ротоглотки,
- ♦ наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу,

- ♦ набряк шиї,
- ♦ збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.



Потрапивши в організм людини, дифтерійні палички швидко розмножуються і виробляють дуже небезпечну мікробну отруту - токсин. Саме він призводить до порушення діяльності серцево-судинної та нервової систем, нирок тощо. У хворих на дифтерію найчастіше уражається м'яз серця (дифтерійний міокардит). **Міокардит - найчастіша причина смерті при дифтерії.**

Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень - ВАКЦИНАЦІЯ дітей, згідно з календарем профілактичних щеплень, і ревакцинація дорослих (кожні 10 років).

Вакцинація, як і перенесене захворювання, вже через 1-1,5 років не гарантує захист від інфікування та захворювання, але захворювання у правильно щеплених буде протікати набагато легше, ніж у тих, хто не має щеплень. Тому так важливо вчасно проводити як вакцинацію, так і ревакцинацію.